

# TRAITEMENT DE LA DIARRHÉE BLANCHE DU PORCELET PAR L'ACUPUNCTURE

J. MILIN

Les points indiqués dans le traitement de cette affection nous ont été indiqués par Phil ROGERS de Dublin qui en avait relevé la liste dans un ouvrage publié en 1977 par The Chinese Acupuncture Research Foundation (Box 84-223, Taipei Taiwan) intitulé "Basic acupuncture : a scientific interpretation and application". Cet ouvrage qui traite d'acupuncture humaine réserve quelques pages à l'acupuncture vétérinaire.

Nous avons déjà eu l'occasion de donner la liste des points indiqués en ajoutant quelques précisions lors des Journées Européennes d'Acupuncture qui ont eu lieu à Paris en 1977. Nous pensons intéresser nos confrères ruraux en leur communiquant cette "recette".

Les points indiqués sont les suivants :

Pai Hui : "Point des cent réunions"

On sait que ce point est en relation avec tous les Jings (méridiens). Il est donc indiqué dans un grand nombre de maladies en particulier lorsqu'il y a fuite d'énergie comme c'est le cas dans une diarrhée.

Localisation : Dans l'espace situé entre les apophyses épineuses de la dernière lombaire et de la première sacrée

Technique d'utilisation : Petite aiguille ronde, de préférence bi-métallique et dont on aura préalablement chauffé le manche. Profondeur 1 cm environ. Manipuler énergiquement car il faut tonifier le point pour apporter de l'énergie.

Chiao-Chao : "Point de l'anus"

C'est le point des diarrhées dans toutes les espèces. Chez l'homme il correspond au 1er point du Du Mai (Vaisseau gouverneur). Il semble qu'il en soit de même chez l'animal.

Localisation : Sur la ligne médiane inférieure, à mi-distance entre la naissance de la queue et l'anus.

Technique d'utilisation : Enfoncer une aiguille assez longue, 1 à 1,5 cm perpendiculairement à la peau. Manipuler légèrement pendant 10 minutes.

### Yu Tang : "Porte de Jade"

Un point chez l'homme porte le même nom avec des indications respiratoires et digestives comme chez le porc, mais situé au milieu du sternum (18 VC) ; On connaît en acupuncture les liens qui existent entre Poumon et Gros Intestin, situés tous deux dans la loge Métal. Notons au passage que la pathologie classique occidentale du porc reconnaît des "pneumoentérites" et il est évident que celles-ci bénéficieront de la puncture du Yu Tang.

Localisation : Elle est chez le porc très différente de celle décrite chez l'homme. Le point est situé sur le palais, de part et d'autre de la ligne médiane, au centre de chaque 3ème crête.

Technique d'utilisation : Maintenir la machoire écartée par un pas-d'âne. Depuis la commissure labiale introduire une aiguille triangulaire et piquer obliquement de quelques millimètres, rapidement pour faire saigner.

### Shan Gen : "Pied de la montagne"

Le point homonyme chez l'homme se situe au milieu de la racine du nez (Point curieux 31), entre les deux canthus internes. Il est indiqué dans les sinusites mais n'a pas d'indications digestives. Rappelons cependant les relations qui existent entre les sinusites et l'énergie du Gros Intestin.

Localisation : Trois points chez le porc. Un point médian en arrière de la partie supérieure du bourrelet du groin et deux, de part et d'autre du premier, à 6 à 8 mm chez le porcelet.

Technique d'utilisation : Ponctures répétées avec une petite aiguille, jusqu'à émission sanguine.

Indications thérapeutiques : Coup de soleil. Rhinite. Rhumatisme.  
Maladies fébriles. Pneumonie. Dyspepsie.  
Intoxications alimentaires.

### Pi Shu : "Assentiment de la Rate"

Ce point, 20 Vessie chez l'homme est situé sur les lignes paravertébrales entre D 11 et D 12. Il est destiné à traiter l'énergie de la Rate et chasser l'humidité ; donc particulièrement indiqué dans les diarrhées aiguës.

Localisation : Chez le porc adulte, entre la 12ème et 13ème côte, du côté gauche à 7,5 cm de part et d'autre de la ligne médiane supérieure. Rectifier pour le porcelet.

Technique d'utilisation : Insérer une aiguille ronde dirigée en bas et en dedans de 6 à 8 mm. Manipulation modérée.

Indications : Dyspepsie. Gonflement abdominal. Anorexie. Apathie.  
Faiblesse. Pancréatite. Anémie.

### Hou San Li : "San Li du postérieur"

Ce point existe dans toutes les espèces avec la même localisation et les mêmes indications digestives et locales. C'est le Tsou San Li (36 E) de l'homme. Son nom "trois distances" indique sa localisation à trois distances au dessous de l'articulation du grasset. Point Ho de l'Estomac, il est situé en profondeur entre le tibia et la fibula. Le point d'implantation de l'aiguille se trouve en avant de la fibula, dans une fosse. L'aiguille doit être, dans toutes les espèces, dirigée vers l'espace tibio-fibulaire.

Localisation : Chez le porc, comme indiqué ci-dessus.

Technique d'utilisation : Cf. plus haut. Manipuler énergiquement.

Indications : Dyspepsie. Diarrhées. Rhumatismes du membre postérieur.


Ti Men : "Porte des larmes" (Tr RUBIN)

Pourrait correspondre aux points curieux Shi Xuan "Dix déclarations", décrits chez l'homme aux extrémités des doigts de la main et indiqués dans les comas. Chez le porc, les seules indications que nous ayons trouvées pour ce point Ti Men concernent uniquement le pied.

Localisation : Bord postéro externe des deux grands doigts du membre antérieur au niveau de l'insertion du ligament interdigité longitudinal excentrique.

Technique d'utilisation : Cautérisation avec une aiguille chauffée au rouge.

Comme il s'agit d'une affection ce traitement devra être répété quotidiennement.



Traitement de la diarrhée blanche du porcelet par l'acupuncture :