

**Cas n°1.**

M. S...72 ans est traité pour des vertiges. Après 5 séances il est très bien amélioré. Il signale alors une constipation qui depuis plusieurs jour le gêne de façon importante. Compte tenu de l'absence de vertiges, on lui propose d'entreprendre un traitement pour la constipation. Il est revu 3 jour après et apparaît très inquiet : Après la dernière séance il a eu une envie irrépressible d'aller à la selle. Il a eu le plus grand mal à se retenir sur le trajet du retour. Arrivé chez lui il se produit une véritable débâcle diarrhéique. Il a peur que cela se reproduise. Une deuxième séance est faite. Le même traitement est conduit. Avec le même résultat. Il ne veut plus que l'on traite sa constipation («*je suis trop sensible* »). On consolide l'action anti-vertigineuse.

**Cas n°2**

Mme X,... est une constipée de longue date. Depuis quelques semaines elle présente une aggravation. La constipation devient opiniâtre et rebelle aux nouveaux laxatifs prescrits par son généraliste. Le traitement est entrepris avec un effet immédiat dès la première séance. A S3 elle signale qu'un rendez-vous avait été pris pour une coloscopie à la demande de son généraliste et avant le début du traitement par acupuncture. Elle demande se demande s'il est bien nécessaire d'y aller dans la mesure ou son transit s'est rétabli avec une selle quotidienne.

Sa dernière coloscopie datant de 8 ans et compte tenu de l'aggravation récente, on lui conseille de faire réaliser l'examen.

On découvre une volumineuse tumeur colique.

**Commentaire**

**Traitement**

6TR, 6Rn 25E, 28E	15 minutes	3 séances par semaines deqi ++ arrêt immédiat des laxatifs
25V, 50V	5 minutes	conseil d'hygiène

**Efficacité majeure du traitement**

Puissant effet laxatif de l'acupuncture dans le cas n°2 (avec réaction négative du patient)

**L'acupuncture n'est pas un critère de différenciation atteinte fonctionnelle/ atteinte organique.**