

Les «Lo Segmentaires», leur symptomatologie et traitement (par les points Ting) (*)

Monsieur le Président
de l'Association Française d'Acupuncture,
Monsieur le Directeur
de l'Institut d'Acupuncture de France,

Mes chers amis,

Nous sommes particulièrement honorés de venir parler devant vous de la Médecine traditionnelle chinoise.

En effet, nous sommes encore bien loin de connaître toute la médecine énergétique et la pensée médicale extrême-orientale. Aussi, abordons-nous aujourd'hui l'étude des «*Lo segmentaires*» des méridiens principaux avec leur symptomatologie et traitement que Yang Chi Chou (1573-1619) a minutieusement cités dans son fameux Zhen Jiu Da Cheng (Compendium de la thermogéno-acupuncture, énoncé N° 72), tirés du chapitre X de Nei King Ling Chou.

● Rappelons que les trajets des «Lo segmentaires» ont été décrits conjointement avec le système de «King Mo» (méridiens principaux) et de «Lo Mo» (méridiens secondaires) pour la première fois en Occident, en 1969 et 1971, dans nos ouvrages intitulés :

– L'Energique Humaine en Médecine Chinoise (avec la collaboration de notre regretté ami, le D^r Chamfrault). – 1969.

– Pathogénie et Pathologie Energétiques en Médecine Chinoise. – 1971.

Pour ne pas trop bousculer l'esprit acupunctural de l'époque, nous n'avons pas signalé leur symptomatologie et traitement ; nous avons simplement inséré leurs trajets dans le groupe des méridiens principaux.

● Les «Lo segmentaires» sont des trajets énergétiques secondaires émanés des méridiens principaux. Ils constituent un ensemble de réseaux de liaisons superficielles et profondes des méridiens principaux.

– Liaisons superficielles ou externes : rapports des méridiens principaux entre eux.

– Liaisons profondes ou internes : terminaisons des méridiens principaux au niveau des organes et entrailles.

Ils sont au nombre de 12 :

- 1 - Lo segmentaires du Poumon.
- 2 - Lo segmentaires du Gros Intestin.
- 3 - Lo segmentaires de l'Estomac.
- 4 - Lo segmentaires de la Rate.
- 5 - Lo segmentaires du Cœur.
- 6 - Lo segmentaires de l'Intestin Grêle.
- 7 - Lo segmentaires de la Vessie.
- 8 - Lo segmentaires du Rein.
- 9 - Lo segmentaires du Maître du Cœur.
- 10 - Lo segmentaires du Triple Réchauffeur.
- 11 - Lo segmentaires de la Vésicule Biliaire.
- 12 - Lo segmentaires du Foie.

(*) Communiqué fait au 2^e Symposium national de AFA. Paris 1978.

— 1 —

«Lo segmentaires» du méridien du Poumon




Fig. 1 :
«Lo segmentaires»
du méridien du Poumon.



手太阴井

Fig 2 :
Point Ting de Chéou Taé Inn (P.) :
Chao Chang (11 P.)

a — DESCRIPTION (Fig. 1).

On distingue :

- «Lo segmentaire» externe.
- Et «Lo segmentaire» interne.

a — «Lo segmentaire» interne : Du réchauffeur moyen (Tchong Jiao) naît un vaisseau qui descend vers le Gros Intestin, remonte au cardia, traverse le diaphragme et pénètre dans le Poumon.

c — «Lo segmentaire» externe : Du Poumon naît un vaisseau qui suit la trachée jusqu'au pharynx, puis redescend vers l'aisselle et ressort au thorax au point Tchong Fou (1 P.).

SYMPTOMATOLOGIE.

L'atteinte de ces «Lo segmentaires» par l'énergie perverse se manifeste cliniquement par :

- Ballonnement abdominal, dyspnée et toux, douleur sus-claviculaire, gastralgie, chaleur à la paume de la main, douleur à l'épaule et pharyngite.

TRAITEMENT (Fig. 2).

Il faut puncturer le point Ting du Chéou Taé Inn (P.), soit le Chao Chang (11 P.) située à 0,1 distance de l'angle unguéal interne (anatomie énergétique) du pouce.

Techniques :

- Puncture «à l'opposé», de 0,1 à 0,3 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (30').
- Moxas 3 fois.

— 2 —

«Lo Segmentaires» du méridien du Gros Intestin

a — DESCRIPTION (Fig. 3).

On distingue :

- «Lo segmentaire» externe.
- «Lo segmentaire» interne.

1 - «Lo segmentaire» externe : deux tronçons :

● Du point Tsienn lu (15 G.I.) part un vaisseau qui contourne l'épaule, arrive au Ta Toui (14 V.G.), situé au-dessous de l'apophyse épineuse de la 7^e vertèbre cervicale.

● Du point Ta Toui (14 V.G.) le vaisseau descend dans le creux sus-claviculaire au point Tsiu Penn (12 E.) et passe au point Tsri Hou (13 E.).

2 - «Lo segmentaire» interne : Deux tronçons :

● Du point Tsri Hou (13 E.), le vaisseau pénètre le Poumon, le diaphragme, puis le Gros Intestin.

● Du Gros Intestin, un second vaisseau gagne le membre inférieur et s'unit au point Cha Lienn (37 E.) de Tsou Yang Ming (E.).




Fig. 3 :
«Lo segmentaires»
du méridien du Gros Intestin

b — SYMPTOMATOLOGIE.

L'atteinte de ces «Lo segmentaires» par l'énergie perverse se manifeste cliniquement par :

- Météorisme abdominal, oppression et douleur thoracique, asthme et tachypnée.

c — TRAITEMENT (fig. 4).

Il faut puncturer le point Ting du Chéou Yang Ming (G.I.), soit le Chang Yang (1 G.I.), situé à 0,1 distance de l'angle unguéal interne (description énergétique) de l'index.

Techniques :

- Puncturer «à l'opposé», de 0,1 à 0,3 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (20'-30').
- Moxas 3 fois.



手陽明井

Fig. 4 :
Point Ting de Chéou Yang Ming (G.I.) :
Chang Yang (1 G.I.)

— 3 —

« Lo segmentaires » du méridien de l'Estomac

a — DESCRIPTION (Fig. 5).

On distingue :

- « Lo segmentaire » externe.
- « Lo segmentaire » interne.

● « Lo segmentaire » externe : Quatre tronçons :

1 - Du point Ing Siang (20 G.I.) naît un vaisseau qui monte à la commissure interne de l'œil, côtoie le méridien de la Vessie et se ramifie au milieu du front.

2 - Du front, le vaisseau descend vers la région génienne, puis s'enfonce dans la gencive supérieure, reparaît dans la région labiale en contournant les lèvres et passe au point Tchreng Tsiang (24 V.C.).

3 - Du point Tchreng Tsiang (24 V.C.), le vaisseau présente un trajet ascendant et contourne de nouveau les lèvres avant de suivre le maxillaire inférieur pour arriver au point Taé Ying (5 E.).

4 - De ce point, le vaisseau passe par le Tché Tché (6 E.), remonte en avant de l'oreille et se ramifie à la région temporale, dans le cuir chevelu.

● « Lo segmentaire » interne : Da Chang ne mentionne pas ces importants segments. Pour le détail, voir « Pathogénie et Pathologie Energétique en Médecine Chinoise ».

b — SYMPTOMATOLOGIE.

L'attente de ces « Lo segmentaires » par l'énergie perverse se manifeste cliniquement par :

- Embarras gastrique, mysanthropie, thermophobie et phonophobie, épistaxis, déviation de la bouche, fièvre paroxystique, folie Yang (irritabilité), douleur aux pieds, météorisme abdominal, dermatose infectieuse, prurit et sensation de froid aux dents.

c — TRAITEMENT (Fig. 6).

Il faut puncturer le point Ting du Tsou Yang Ming (E.), soit le Li Toé (45 E.), situé à l'angle unguéal externe du 2^e orteil.

Techniques :

- Puncture « à l'opposé », de 0,1 à 0,3 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (20'-30').
- Moxas 1 fois.




Fig. 5 :
« Lo segmentaires »
du méridien de l'Estomac.



足阳明井

Fig. 6 :
Point Ting de Tsou Yang Ming (E.) :
Li Toé (45 E.).

— 4 —

«Lo segmentaires» du méridien de la Rate

a — DESCRIPTION (Fig. 7).

Da Cheng ne décrit que le «Grand Lo» de la Rate.
Celui-ci régit le groupe de «Cinq Lo» :

- Lo du Cœur.
- Lo du Rein.
- Lo du Poumon.
- Lo de la Rate.
- Lo de l'Estomac.

excepté le Lo du Foie et celui de la Vésicule Biliaire.
Lorsque les «Cinq Lo» sont simultanément atteints par
l'énergie perverse, les pouls sont en principe conservés.

b — SYMPTOMATOLOGIE.

Perte de connaissance dite «coma cadavérique»
(coma carus).

On notera : «Le Inn est en plénitude en haut.
L'énergie perverse siège donc dans cette partie du corps ;
elle suit les voies d'«empiètement» et de «mépris» en
troublant l'énergie Yang, ce qui provoque l'obstruction
des «Cinq Lo» : d'où coma.»

c — TRAITEMENT (Fig. 8).

Il faut puncturer successivement les points :

- 1 - Ting de Tsou Taé Inn (Rt) : Inn Po (1 Rt).
- 2 - Ting de Tsou Chao Inn (Rn) : long Tsiuann (1 Rn).
- 3 - Ting de Tsou Yang Ming (E.) : Li Toé (45 E.).
- 4 - Ting de Chéou Taé Inn (P.) : Chao Chang (11 P.).
- 5 - Ting de Chéou Chao Inn (C) : Chao Tchrong (9 C.).

Techniques :

- Puncture bilatérale, de 0,2 distance de profondeur. Si aucun résultat n'est obtenu, on ajoutera le Chenn Menn (7 C.).

En dernier ressort, on doit recourir à la méthode
suivante :

● Souffler fortement dans chaque oreille à l'aide d'un
tube en bambou ou en verre dans le but de désobstruer
les «Lo» (l'oreille étant le lieu de réunion de tous les «Lo»
du corps).

● Puis appliquer 3 moxas au point Ta Toui (14 V.G.) après
l'avoir puncturé suivant la technique de dispersion.




Fig. 7 :
Le «Grand Lo de la Rate»
ne commande pas le Foie
et la Vésicule Biliaire.



Fig. 8 :
Point Ting de Tsou Taé Inn (Rt) :
Inn Po (1 Rt).

— 5 —

«Lo segmentaires» du méridien du Cœur




Fig. 9 :
Les «Lo segmentaires»
du méridien du Cœur.



手少阴井

Fig. 10 :
Point Ting de Chéou Chao Inn (C.) :
Chao Tchrong (9 C.)

a — DESCRIPTION (Fig. 9).

On distingue trois vaisseaux internes :

- 1 - Le premier part du Cœur, monte au pharynx et gagne l'appareil oculaire.
- 2 - Le deuxième part aussi du Cœur, traverse le diaphragme et entre dans l'Intestin Grêle.
- 3 - Le troisième part également du Cœur, traverse le Poumon et apparaît dans le creux axillaire, au point Tsiuann (1 C.).

b — SYMPTOMATOLOGIE.

L'atteinte de ces «Lo segmentaires» se manifeste cliniquement par :

- Cardialgie, polydipsie, stockage énergétique du Cœur (Ty Quyêt), pleurdynié, avec impression de chaleur au Cœur, hébétude, amnésie, folies-Yang (irritabilité).

c — TRAITEMENT (Fig. 10).

Il faut puncturer le point Ting de Chéou Chao Inn (C.), soit le Chao Tchrong (9 C.), situé à 0,1 distance de l'angle unguéal interne (anatomie énergétique) de l'auriculaire.

Techniques :

- Puncture «à l'opposé», de 0,1 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (20'-30').
- Moxas 3 fois.

Si pas de résultat, ajouter le Chenn Menn (7 C.).

— 6 —

«Lo segmentaires» du méridien de l'Intestin Grêle

a — DESCRIPTION (Fig. 11).

On distingue :

- Lo segmentaires externes.
- Lo segmentaires internes.

● «Lo segmentaires externes» : Deux tronçons.

1 - Un vaisseau naît au point Tsienn Tchong lu (15 I.G.), gagne le Taé Toui (14 V.G.), descend au creux sus-claviculaire au point Tsiué Penn (12 E.) et passe au creux axillaire au point Tsri Tsiuann (1 C.).

2 - Du Tsiué Penn (12 E.), un autre vaisseau gagne la région cervicale, puis la région génienne et l'angle externe de l'œil, pénètre dans l'oreille. A cet endroit, le vaisseau bifurque en deux branches :

- La première descendante, au creux axillaire, au point Tsri Tsiuann (1 C.).
- La seconde transversale, au nez, au milieu du front, puis descend à la pommette.

● «Lo segmentaires» internes :

Du point Tsri Tsiuann (1 C.), le vaisseau pénètre dans le thorax, entre dans le Cœur où il se divise en deux branches :

- L'une, ascendante, gagne la pharynx.
- L'autre, descendante, le diaphragme, puis l'Estomac et enfin l'Intestin Grêle où il envoie un vaisseau vers le Cha Lienn (39 E.).

c — SYMPTOMATOLOGIE.

L'atteinte de ces «Lo segmentaires» par l'énergie perverse se manifeste cliniquement par :

- Inflammation maxillaire, torticolis, hyperalgie de l'épaule et du bras, acouphène, conjonctivite, pharyngite, ballonnement abdominal.

c — TRAITEMENT (Fig. 12).

Il faut puncturer le point Ting de Chéou Taé Yang (I.G.), soit le Chao Tché (1 I.G.), situé à 0,1 distance de l'angle unguéal externe (anatomie énergétique) de l'auriculaire.

Techniques :

- Puncture «à l'opposé», de 0,1 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (20'-30').
- Moxas 3 fois.




Fig. 11 :
Les «Lo segmentaires»
du méridien de l'Intestin Grêle.



手太阳井

Fig. 12 :
Point Ting de Chéou Taé Yang (I.G.) :
Chao Tché (1 I.G.)

— 7 —

**« Lo segmentaires »
du méridien de la Vessie**




Fig. 13 :
« Lo segmentaires »
du méridien de la Vessie.



足太阳井

Fig. 14 :
Point Ting de Tsou Taé Yang (V.) :
Tché Inn (67 V.).

a — DESCRIPTION (Fig. 13).

Du point Ton Tien (7 V.), un vaisseau passe au Paé Roé (20 V.G.) où il se divise en deux branches :

- La branche externe gagne l'angle supérieur de l'oreille au point Koun Penn (7 V.B.).
- La branche interne pénètre profondément dans l'encéphale et ressort au point Lo Tsri (8 V.).

c — SYMPTOMATOLOGIE.

L'atteinte de ces « Lo segmentaires » se manifeste cliniquement par :

- Hémorroïdes, maladie du « Froid de l'automne », folies-Inn et folies-Yang, cervico-céphalalgie, ophthalmalgie, larmoiement, rhinorrhée et épistaxis, rachialgie, algoparesthésie du membre inférieur avec paralysie du 5^e orteil.

c — TRAITEMENT (Fig. 14).

Il faut puncturer le point Ting de Tsou Taé Yang (V.), soit le Tché Inn (67 V.), situé à 0,1 distance de l'angle unguéal externe du 5^e orteil.

Techniques :

- Puncture bilatérale, de 0,1 à 0,2 distance de profondeur ; aiguille à demeure en fonction de la gravité de la maladie.
- Si pas de résultat, ajouter le Tchinn Menn (63 V.) ; puncture verticale de 0,3 à 0,5 distance de profondeur.
- Si malgré le Tchinn Menn (63 V.), on n'observe aucune amélioration, ajouter le Chenn Mo (62 V.) ; puncture verticale, de 1,5 distance de profondeur.
- De façon générale, on laisse ces trois aiguilles à demeure pendant la durée d'un parcours de 10 « Li » (= 5 400 mètres ; voir Da Cheng, dans le Mensuel N° 54).

— 8 —

«Lo segmentaires» du méridien du Rein

a — DESCRIPTION (Fig. 15).

Un vaisseau part de l'organe-Rein, arrive à l'organe-Foie, traverse le diaphragme, gagne l'organe-Poumon, le pharynx et la base de la langue.

Du Poumon, un vaisseau passe au Cœur et s'unit au méridien du Maître du Cœur dans le milieu de la poitrine au point Trann Tchong (17 V.C.).

b — SYMPTOMATOLOGIE.

Quand l'énergie perverse (alimentaire) pénètre dans ces «Lo segmentaires», cette atteinte s'exprime cliniquement par :

- «Sept types de cardialgies», précordialgie, ballonnement abdominal (de caractère très intense et bref), plénitude et oppression thoracique.

c — TRAITEMENT (Fig. 16).

Il faut puncturer le point Ting de Tsou Chao Inn (Rn), soit le long Tsiuann (1 Rn), situé au centre de la plante du pied (à l'extrémité du «V» formé par la réunion des masses musculaires).

Techniques :

- Puncture «à l'opposé», de 0,5 distance, en le faisant saigner ; le malade éprouve une sensation de faim dès l'ablation de l'aiguille et guérit au terme de 5 séances.
- Moxas 3 fois.




Fig. 15 :
«Lo segmentaire»
du méridien du Rein.



足少阴井

Fig. 16 :
Point Ting de Tson Chao Inn (Rn) :
long Tsiuann (1 Rn)

«Lo segmentaires» du méridien du Maître du Cœur




Fig. 17 :
«Lo segmentaires»
du méridien du Maître du Cœur



手厥阴井

Fig. 18 :
Point Ting de Cheou Tsiué Inn (M.C.) :
Tchong Tchrong (1 M.C.)

a — DESCRIPTION (Fig. 17).

On distingue :

- Lo segmentaire interne.
- Lo segmentaire externe.

1 - «Lo segmentaire» interne naît de l'Enveloppe du Cœur (Maître du Cœur, M.C.), gagne le Trann Tchong (17 V.C.), puis arrive à Tienn Tchen (1 M.C.).

Du Trann Tchong (17 V.C.) part un autre vaisseau qui traverse le diaphragme et s'unit au Triple Réchauffeur.

2 - «Lo segmentaire» externe naît du point Lao Kong (8 M.C.), gagne l'extrémité de l'annulaire pour s'unir au Koann Tchrong (1 T.R.).

b — SYMPTOMATOLOGIE.

L'atteinte de ces «Lo segmentaires» se manifeste cliniquement par :

- Cardialgie, précordialgie avec impression de chaleur dans la paume de la main, plénitude thoracique accompagnée d'algo-contraction du bras, inflammation axillaire, faciès rubicond, sclérotique jaune, rires immotivés, acouphène.

c — TRAITEMENT (Fig. 18).

Il faut puncturer le point Ting du Chéou Tsiué Inn (M.C.), soit le Tchong Tchrong (1 M.C.), situé à 0,1 distance de l'angle unguéal interne (anatomie énergétique) du médius.

Techniques :

- Puncture «à l'opposé», de 0,1 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (20'-30').
- Moxas 3 fois.

— 10 —

«Lo segmentaire» du méridien du Triple Réchauffeur

a — DESCRIPTION (Fig. 19).

On distingue :

- «Lo segmentaires» externes.
- «Lo segmentaires» internes.

● «Lo segmentaires» externes. Deux tronçons :

1 - Du point Tsienn Liou (15 T.R.) part un vaisseau qui passe au Ta Toui (14 V.G.), croise le méridien de la Vésicule Biliaire sans l'atteindre et descend au creux sus-claviculaire au point Tsiué Penn (12 E.) et arrive au Tsri Ho (13 E.).

2 - Un autre vaisseau part du point Tchi Mo (18 T.R.), pénètre profondément dans l'oreille, reparaît en avant d'elle, passe au point Keu Tchou Jenn (3 V.B.), descend au maxillaire inférieur, puis remonte à l'angle externe de l'œil au point Sen Tchou (23 T.R.) et s'unit au méridien de la Vésicule Biliaire au point Trong Tseu Liou (1 V.B.).

● «Lo segmentaires» internes. Deux tronçons :

1 - Un vaisseau part du point Tsri Ho (13 E.), pénètre dans le thorax jusqu'au point Trann Tchong (17 V.C.), puis traverse le diaphragme et s'unit au Triple Réchauffeur.

2 - Un autre vaisseau part du Trann Tchong (17 V.C.), ressort au creux sus-claviculaire au point Tsiue Penn (12 E.) pour s'unir au point Mou Tchong (16 T.R.).




Fig. 19 :
«Lo segmentaires»
du méridien du Triple Réchauffeur.

b — SYMPTOMATOLOGIE.

L'atteinte de ces «Lo segmentaires» par l'énergie perverse se manifeste cliniquement par :

- Surdit , acouph ne, ophtalmalgie et r trocardialgie. (D'apr s Da Cheng : hyperalgie de la r gion comprise entre les D3-D5 et les points : Sin lu, 15 V. ; Kao Roang, 43 V., et Chenn Tsrang, 44 V.).

c — TRAITEMENT (Fig. 20).

Il faut puncturer le point Ting de Ch ou Chao Yang (T.R.), soit le Koann Tchrong (1 T.R.), situ  0,1 distance de l'angle ungu al externe (anatomie  nerg tique) de l'annulaire.

Techniques :

- Puncture «  l'oppos », de 0,1 distance de profondeur ; aiguille   demeure pendant la dur e d'un repas (20'-30').
- Moxas 3 fois.


En l'absence de r sultat, puncturer le point lu (3^e point Su-Antique) du Ch ou Chao Yang (T.R.), soit le Tchong Tchou (3 T.R.).



手少阳井

Fig. 20 :
Point Ting de Ch ou Chao Yang (T.R.) :
Koann Tchrong (1 T.R.).

**«Lo segmentaires»
du méridien de la Vésicule Biliaire**



a — **DESCRIPTION** (Fig. 21).

Dan Cheng ne décrit que les «Lo segmentaires» de la région «facio-cervico-thoraco-abdominale».

Il distingue :

— «Lo segmentaires» *externes* : Du point Trong Tseu Liou (1 V.B.) naît un vaisseau qui descend vers le bord inférieur du maxillaire inférieur, au point Taé Ying (5 E.), s'unit au Chéou Taé Yang (I.G.) au point Koun Liou (18 I.G.), passe au Tché Tché (6 E.), arrive à la région occipale, descend au creux sus-claviculaire au point Tsiué Penn (12 E.) et passe au Tsri Ho (13 E.).

— «Lo segmentaires» *internes* : Du Tsri Ho (13 E.), le vaisseau pénètre dans le thorax, se ramifie au Foie et à la Vésicule Biliaire, reparaît au Tsri Tchong (30 E.), arrive au Kou Kou (2 V.C.), contourne l'appareil génital et passe au Roann Tsiou (30 V.B.).

Fig. 21 :
«Lo segmentaires»
du méridien de la Vésicule Biliaire

b — **SYMPTOMATOLOGIE.**

L'atteinte de ces «Lo segmentaires» par l'énergie perverse se manifeste cliniquement par :

— Douleur thoracique avec impression de lourdeur à la face, céphalé et ophtalmalgie, douleur sus-claviculaire irradiant jusqu'à l'aisselle ; maladie du «Froid de l'automne» (Nguoc = frissons et fièvre par intermittence).

c — **TRAITEMENT** (Fig. 22).

Il faut puncturer le point Ting de Tson Chao Yang (V.B.), soit le Tsiou Inn (44 V.B.), situé à 0,1 distance de l'angle unguéal externe du 4^e orteil.

Techniques :

— Puncture «à l'opposé», de 0,1 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (20'-30').

— Moxas 3 fois.



足少阳井

Fig. 22 :
Point Ting de Tson Chao Yang (V.B.) :
Tsiou Inn (44 V.B.)

— 12 —

«Lo segmentaires» du méridien du Foie

a — DESCRIPTION (Fig. 13).

Les trajets de «Lo segmentaires» du Foie ne sont pas correctement décrits dans Da Cheng. Il y a invasion du «Lo longitudinal» et des «Lo segmentaires». Voici ce que nous lisons dans Da Cheng :

«Un vaisseau part du Li Kao (5 F.) situé à 5 distances au-dessus de la malléole interne, suit le bord interne du tibia, arrive au scrotum et au pénis.»

Par contre, la symptomatologie correspond bien aux troubles des trajets des «Lo segmentaires». (Voir ci-dessous).

b — SYMPTOMATOLOGIE.

Quand l'énergie perverse pénètre dans les «Lo segmentaires» du Foie, les signes essentiels sont les crises herniaires : douleurs très violentes irradiant vers la région péri-ombilicale. (Voir trajets abdominaux du méridien du Foie).

c — TRAITEMENT (Fig. 14).

Il faut puncturer le point Ting de Tsou Tsiué Inn (F.), soit le Taé Toun (1 F.), situé au niveau des «3 poils» du gros orteil.

Techniques :

- Puncture «à l'opposé», de 0,1 distance de profondeur ; aiguille à demeure pendant la durée d'un repas (20' -30').
- Moxas 3 fois.

En cas de récurrence, la guérison est obtenue en 3 jours.

CONCLUSION :

La symptomatologie et le traitement des «Lo segmentaires» rapportés par Da Cheng ne figurent nulle part dans les ouvrages modernes.

Nous en parlons, même si cet apport rend encore plus complexe la physiopathologie énergétique, car il nous paraît nécessaire d'en avoir un abord complet pour approfondir les recherches sur le mécanisme de l'action acupuncturale.




Fig. 23 :
Cette figure ne représente pas
le «Lo segmentaire» mais le
«Lo longitudinal» du Foie.
(Voir «Pathogénie et Pathologie énergétiques»



足厥阴井

Fig. 24 :
Point Ting du Tsou Tsiué Inn (1 F.) :
Taé Toun (1 F.)